


Haiti : Mise Ã jour des projections de sÃ©curitÃ© alimentaire avril/septembre 2012

Description

default watermark

Depuis la fin du mois de mai, on a observÃ© un renversement de la situation mÃ©tÃ©orologique en HaÃ¯ti. Les pluies ont diminuÃ© substantiellement, provoquant un Ã©tat de sÃ©cheresse gÃ©nÃ©ralisÃ© Ã travers le pays, plus particuliÃ¨rement dans les communes du Bas Nord-Ouest, du Haut Artibonite, de lâ??Ouest (notamment La Gonave, Gressier, LÃ©ogane), du Sud-est (Bainet, CÃ´tes-de-Fer, Marigot, Cayes Jacmel, Anse Ã Pitre), du Nord (Pignon, la Victoire, Ranquite), de la Grande-Anse (Corail, Pestel, Abricot, Bonbon) et surtout du Nord-est (particuliÃ¨rement Ferrier, Capotilleâ?¦). Les cultures comme le maÃ¯s qui Ã©taient au stade vÃ©gÃ©tatif ou de lâ??Ã©piaison en ont beaucoup souffert. BÃ©nÃ©ficiant dâ??un surplus dâ??humiditÃ© en avril, le maÃ¯s aussi bien que le sorgho ont Ã©tÃ© lâ??objet de carence hydrique qui sâ??est bien vite manifestÃ©e au dÃ©but du mois de juin, entrainant ainsi une baisse de la production maÃ¯s allant jusquâ??Ã 40 Ã 50 pour cent par rapport Ã une annÃ©e normale. Les consÃ©quences sur les cultures varient en fonction des variÃ©tÃ©s plantÃ©es, de la date du semis et de la rÃ©gion agro-Ã©cologique.

La principale cÃ©rÃ©ale plantÃ©e au cours de la campagne du printemps, le maÃ¯s, est aprÃ¨s le riz, la plus consommÃ©e par la population. Beaucoup moins cher, le maÃ¯s est de loin plus accessible aux pauvres que le riz, particuliÃ¨rement dans le milieu rural. Câ??est aussi une culture de rente pour certains agriculteurs qui le vendent Ã lâ??Ã©tat vert ou en grain. Chez les mÃ©nages pauvres, producteurs de maÃ¯s, lâ??autoconsommation est largement pratiquÃ©e. Si les pluies sâ??arrÃªtent, les pauvres peuvent se trouver dans la prÃ©caritÃ© dÃ¨s le mois de septembre dans de nombreuses communes des rÃ©gions prÃ©citÃ©es (particuliÃ¨rement dans le nord-ouest et le Nord-est) oÃ¹ se pratique la culture du maÃ¯s. Quant aux haricots, dont les rÃ©coltes sont souvent affectÃ©es par des excÃ¨s dâ??humiditÃ© au cours du mois de mai, la faible pluviomÃ©trie enregistrÃ©e Ã la fin du mois de mai 2012 leur a Ã©tÃ© plutÃ´t favorable. Globalement, la rÃ©colte des haricots sera lÃ©gÃ¨rement infÃ©rieure Ã la moyenne Ã cause de lâ??excÃ¨s de pluie dans certaines localitÃ©s et la sÃ©cheresse dans dâ??autres. Dans le bas Plateau Central et le bas Artibonite, par exemple, les agriculteurs ont eu une trÃ¨s bonne rÃ©colte de haricots due Ã une pluviomÃ©trie adÃ©quate dans les aires de plantation, mais elle sera mauvaise sinon nulle dans le bas Nord-Ouest Ã cause de la faiblesse des prÃ©cipitations.

Les variÃ©tÃ©s de maÃ¯s Ã cycle court, plantÃ©es en basse altitude au cours du mois de mars, nâ??ont pas Ã©tÃ© affectÃ©es par cette sÃ©cheresse. Elles montre replique ont atteint leur pleine maturitÃ© bien avant le dÃ©clenchement de ce phÃ©nomÃ¨ne. Par contre, celles plantÃ©es au cours du mois dâ??avril/mai ont beaucoup souffert de stress hydrique. Ce sont surtout les plantations dans des sols superficiels et Ã©rodÃ©s qui ont Ã©tÃ© les plus affectÃ©es. Elles ont dÃ©jÃ atteint le point de flÃ©trissement et ne porteront pas dâ??Ã©pis. Quand Ã celles ensemencÃ©es en montagne humide ou dans les plateaux, en mars ou en avril, elles peuvent encore se rÃ©cupÃ©rer si les pluies, amorcÃ©es depuis mi-juin, se poursuivent. Câ??est particuliÃ¨rement le cas dans les hauteurs de Mare Rouge (Nord-Ouest) ou dans le haut Plateau Central.

Categorie

1. Uncategorized

date crÃ©Ã©e
15/05/2012
Auteur
johnaku

default watermark