
Evaluation prÃ©visionnelle de la performance des rÃ©coltes de la campagne agricole de printemps 2013.

Description

Dâ??une faÃ§on gÃ©nÃ©rale, lâ??annÃ©e agricole mars 2013- fÃ©vrier 2014 promet dâ??Ãªtre une Ã une augmentation de 45% des cÃ©rÃ©ales par rapport Ã 013 si les rÃ©coltes des saisons dâ??Ã©tÃ© et



dâ??automne/hiver bÃ©nÃ©ficient des mÃªmes conditions

default watermark

climatiques favorables observÃ©es jusquâ??Ã la fin de septembre 2013 (pas de sÃ©cheresse, pas dâ??excÃ¨s dâ??eau, pas de cyclones ou dâ??inondations online viagra without prescription accentuÃ©s), les intrants de base sont disponibles. Par contre, lâ??annÃ©e fiscale octobre 2012-septembre 2013 sâ??achÃ¨ve avec de bonnes productions corrigeant les pertes observÃ©es en octobre 2012 aprÃ¨s le passage du cyclone Sandy.

Tout de mÃªme, ce niveau de production est infÃ©rieur de 5% par rapport Ã lâ??annÃ©e 2009-2010, annÃ©e de trÃ¨s bonne production. Les lÃ©gumineuses devront augmenter de 10% en 2013-2014 par rapport Ã lâ??annÃ©e agricole prÃ©cÃ©dente mais avec 10% de dÃ©ficit par rapport Ã 2009-2010.

Lâ??Ã©volution de la production 2013-2014 en Ã©quivalent cÃ©rÃ©aliers (EC) indique une augmentation de 33% par rapport Ã lâ??annÃ©e 2012-2013 mais en dessous de 11% de lâ??annÃ©e 2009-2010.

10. Comparaison productions 2013-2014 avec 2012-2013 et 2009-2010 (TEC)

Produit	2013-2014	2012-2013	Différence 2012-2013	2009-2010*	Différence 2009-2010
Total Céréales	511,109.59	350,348.67	46%	533,748.66	-4%
Total Légumineuses	198,890.87	175,945.13	13%	219,614.64	-9%
Total tubercules	470,559.03	369,876.60	27%	537,271.02	-12%
Banane et Plantain	147,561.62	105,677.52	40%	195,096.95	-24%
Total	1,328,121.12	1,001,847.92	33%	1,485,731.27	-11%

Source: Calcul basé sur les coefficients de perte et coefficient TEC

**les productions de l'année 2009-2010 sont corrigées avec l'utilisation des superficies du RGA 2009*

Globalement, en considÃ©rant la superficie de maÃ¯s, haricot, pois congo, banane et les tubercules, environ 75% de la superficie agricole, consacrÃ©e habituellement Ã la saison de printemps, a livrÃ© une bonne production au printemps et en Ã©tÃ©. Les rÃ©coltes du maÃ¯s sont Ã©talÃ©es de juillet Ã septembre/octobre compte tenu de la prÃ©occitÃ© des variÃ©tÃ©s cultivÃ©es et des dates de semis en retard qui reflÃ¨tent lâ??arrivÃ©e des pluies dans les diffÃ©rentes aires agro-Ã©cologiques. Le haricot est rÃ©coltÃ© plus tÃ´t entre avril â?? juin et juillet pour les zones en retard. Les programmes dâ??achats locaux mis en place par le programme Ede PÃ¨p, le PAM, lâ??entreprise privÃ©e Ti-Malice ont incitÃ© les producteurs Ã investir beaucoup plus.

Le MARNDR, le MinistÃ¨re Ã la promotion de la paysannerie et les diffÃ©rents partenaires (FAO, Winner, ACDI-VOCA, IICA, RESEPAG, dâ??autres programmes, etc.) ont mis Ã la disposition des producteurs un volume de semence au moment des semis. Plusieurs foires semenciÃ¨res ont Ã©tÃ© organisÃ©es. Cependant, les semences sont insuffisantes pour combler les attentes des producteurs dont le stock de semence Ã©tait au plus bas suite Ã la sÃ©cheresse de lâ??annÃ©e 2012 et aux dÃ©gÃ¢ts des cyclones Isaac et Sandy. Les producteurs ont du complÃ©ter selon leur pouvoir dâ??achat les intrants en sâ??approvisionnant sur le marchÃ©. Lâ??engrais fut accessible entre 800 et 900 gourdes le sac de 45 kg.

default watermark

Les facteurs limitants de la saison de printemps 2013 sont dâ??ordre structurel: le faible rendement du matÃ©riel vÃ©gÃ©tal, la faible fertilitÃ© dâ??une bonne partie des sols dÃ©gradÃ©s, les faibles ressources du producteur pour complÃ©ter les subventions reÃ§ues du MARNDR et de ses partenaires, sa faible productivitÃ© du travail.

La Grand-Anse, les Nippes, lâ??ouest, le Centre, lâ??Artibonite, le nord-est, le nord et la partie ouest du nord-ouest (Anse Ã FÃ´leur, St-Louis du nord, une partie de lâ??Ile de la Tortue et la partie humide de Port-de-Paix) ont une bonne production de mais, de haricot et des autres lÃ©gumineuses (pois de souche, arachide) supÃ©rieure Ã lâ??annÃ©e 2012. Environ 20% des rÃ©coltes de banane et de tubercules a lieu dans ces mÃªmes zones. Et ces rÃ©coltes vont se poursuivre avec les conditions qui sont favorables le reste de lâ??annÃ©e.

Cependant le dÃ©partement du sud est frappÃ© au printemps et jusquâ??en Ã©tÃ© par une forte sÃ©cheresse qui serait considÃ©rÃ©e comme lâ??une des plus difficiles depuis ces 30 derniÃ¨res annÃ©es.

Environ 25% de la superficie de printemps du pays est affectÃ©e par cette sÃ©cheresse qui a sÃ©vi dans 12 communes du dÃ©partement du sud, dans plus de 4 communes du sud-est, les 4 communes du bas Nord-ouest (Far West), Anse Rouge dans lâ??Artibonite et une vingtaine dâ??autres communes dans le reste du pays, soit par sÃ©cheresse ou excÃ¨s dâ??humiditÃ© ou par des inondations (plateau central et nord).

Dans le sud-est, Cayes-Jacmel, Marigot et la partie est de Jacmel ont donnÃ© une performance meilleure par rapport Ã 2012. Par contre, les zones de basse altitude frappÃ©es par la sÃ©cheresse et les zones de haute altitude avec excÃ¨s dâ??humiditÃ© au niveau de Thiotte, Anse Ã Pitres, Grand-Gosier, Belle-Anse ont donnÃ© une performance infÃ©rieure Ã 2012. La production de la zone Ã moyenne altitude de ces 4 communes a une performance meilleure quâ??en 2012.

La zone la plus frappÃ©e par la sÃ©cheresse dans le sud-est est la partie ouest de Jacmel, La VallÃ©e de Jacmel, CÃ´te de fer et Bainet. Le haricot et le mais sont perdus ou non semÃ©s faute de

pluies.

La riziculture du nord-est a eu une trÃ¨s faible production pendant le printemps alors que le riz dâ??Ã©tÃ© sâ??est installÃ© favorablement entre juin, juillet et aout.

Des inondations ont lieu dans le plateau central en mai avec pertes de plantations : Thomassique, Hinche, Boucan CarrÃ© et Maissade. Le nord a subi des inondations en mai et juin : pertes de cultures Ã Limonade, Bahon, Ranquitte, la Victoire, Pignon, Grand-RiviÃ¨re du Nord, St Raphael

Les pluies qui reviennent en juillet, en aout, septembre et octobre sur presque tout le pays y compris le sud sont favorables Ã la croissance des cultures et poussent les producteurs Ã commencer plus tÃ´t la derniÃ¨re saison (automne-hiver). Le sud a pu avoir une production tardive en Ã©tÃ© et entame la production dâ??automne-hiver.

Les estimations de lâ??annÃ©e 2013-2014 sont faites en supposant que lâ??Ã©tÃ© et lâ??automne/hiver bÃ©nÃ©ficient de conditions favorables de production sans grosses pertes. Le volume de production 2013-2014 en tonnes mÃ©triques des groupes de produits a connu une augmentation de 10 Ã 45% par rapport 2012-2013 et une baisse par rapport Ã 2009-2010 variant de 5 Ã 32%.

default watermark

EVALUATION PREVISIONNELLE DE L'ANNEE 2013-2014 (Tonnes metriques)

	Production 2012-2013	Production 2013-2014 (prevision)	Variation par rapport 2012-2013	Production 2009-2010	Variation par rapport a 2009-2010
Total Cereales	375174.34	545598.0856	45%	570528.972	-5%
Total Legumineuses	221842.53	243992.9126	10%	268585.4078	-10%
Total tubercules	1136149.92	1442669.411	27%	1649730.573	-14%
Banane et Plantain	317349.9	443127.9945	40%	585876.72	-32%

Source: calcul effectue à partir des donnees du RGA 2009 et de la performance de printemps 2013, juillet et septembre 2013

TÃ©lÃ©chargez le rapport

Categorie

1. Uncategorized

date crÃ©Ã©e
21/05/2013
Auteur
cnsa